

التعرف على مصادر حبوب اللقاح والعسل في منطقة الفكي هاشم (السودان)

د. سهام كامل ناجي

المخلص:

هذه الدراسة هي جزء من بحث شامل للتعرف على مصادر حبوب اللقاح والعسل في السودان. وقد

أجريت هذه الدراسة بمنطقة الفكي هاشم (ولاية الخرطوم) بوسط السودان.

تم تجميع عينات من العسل وحبوب اللقاح من داخل خلايا النحل لتجهيز الشرائح ومقارنتها بتلك التي

جمعت من ازهار النباتات حول المنحل وايضاً الموجودة في بعض المراجع.

أوضحت الدراسة ان ترتيب مصادر الغذاء للنحل في منطقة الدراسة هي كالآتي:

- العائلة الميرسنتية (Myrtaceae) N1 P2
- العائلة النجيلية (Graminae) N3 P1
- عائلة الموالح (Rutaceae) N3 P2
- العائلة البقمية (Caresalpinaceae) P2
- العائلة (Meliaceae) N3 P2
- العائلة البقولية (Leguminosae) N3 P2
- العائلة المركبة (Asteraceae) N3 P2
- العائلة الفرعية (Cucurbitaceae) N3 P3
- العائلة الطلحية (Mimosaceae) N3 P3
- العائلة الفراشية (Fabaceae) N3 P3

إضافة إلى بعض العوائل الاخرى الاقل اهمية مثل الطننيدية والخبازية والشقوية والخيمية والزقومية

وعائلة عرف الديك.